

A N

PATELLÆ TRANSVERSIM
FRACTURA SANABILIS?
THESES
ANATOMICO-CHIRURGICÆ,

QUAS, Deo juvante, & Præside M. PETRO-MICHAËLE
ALLOUEL, Artium & Chirurgiæ Magistro, Doctore-
Medico Remensi, Regiæ Chirurgorum Academiae Socio, nec-
non antiquo Regis Præsidi Nosomiorum que Monœci Medico;
tueri conabitur FRANCISCUS-MATHÆUS DIDIER DE
LONROY, Parisinus, Artium in almâ Universitate Parisiensi
Magister, & in Duaci Nosocomio Militari nuper Adjutor-
Chirurgus; Theseos Auctor.

P A R I S I I S;

IN REGIIS CHIRURGORUM SCHOLIS.

Die Sabbati 15^a Julii à sesqui-secundâ post meridiem ad septimam.

PRO ACTU PUBLICO
ET
MAGISTERII LAUREA.

*hac non habita
fuit, multos ob-
erroses, per Typographum
sive Lapidatorem.*



NATUS HONORANDO DATQUE DICATQUE PATRI.



D. O. M.

THESES

ANATOMICO-CHIRURGICÆ.



I.



TRUM Patellæ *transversim* fractura sit sanabilis differunt adhuc Authores quidem (1) & Pratici & Théoretici? Ex Illis Plerique jam nunc *longitudinalis* concedunt curationem : Dum agitur de *transversâ*, repente nutare judicium, quis non miraretur?

(1) « Absque claudicatione existere nequit *mole* fractura. . . . Paræus. lib. XV cap. XXI.

— » Nullâ arte, nullâque industriâ curari non potest sine claudicatione patellæ fractura. . . . Hildan. observ. 88. Centur. V.

— Omnes ferè recentiores duntaxat de fracturâ transversali.

Qualiscumque sit fracturæ directio, quoad ossis indolem (2), Calli quoad effusionem in Articulo, discrimen excogitatum non sentit Arte compos. Si speciem fracturæ spectes, difficilis & ardua, non verum impossibilis (3) Medela videbitur.

I I.

Omnes osseas partes successivè variis gradibus ossificationem perfectam attingere prorsus manifestat Osteogenia. Sicut & alia *necessariò* Rotula sit ossea. *Carpi*, *Tarsi* quodlibet fractum os, Arte cogitur in unum; humeralis extremitas *Claviculæ* adunatur, consolidatur *Olecranon*, tendinem ruptum Natura cæmentat: sic affatur Analogia.

Peragi posse curam hodierna scripta probant; discussionis aliundè nondum Experientia secatur (4). Si variis in fracturæ speciebus non vararent præmissa haud adeò conclusiones stupendæ viderentur: *longitudina-*

(2) » *Variâ indole ossis fracti*, § 342. « ossa v. g. majora, ut os femoris, humeri, &c. « cavum habent in quo medulla reconditur; claviculæ, costæ, ossa carpi, tarsi, *Rotula* » non habent tale cavum medullâ plenum; undè à majoribus his ossibus fractis sæpè medullæ læsio contingit, à quâ pessima fieri possunt mala. . . . Comm. Doct. Wanswiet. » T. I. p. 509.

(3) PETITUS noster in immortalis ossium de morbis opere dicit. . . . quamvis fractura sit reducenda difficilior, dum pars superior parva est, periculosa minùs. . . . vol 2. p. 226.

— Sit accidentibus concomitata, sit in plures etiam divisa partes, adhuc sanabilem experientia judicat. . . . Hujus-cæ Theseos Præses quædam illius speciei tenet observata.

(4) DD. PETITUS, HEIST. & alii dubium tollunt. . . . MM. DIDIER, ALLOUEL, antiqui Scholarum Præpositi, paucis ab hinc annis viderunt rotulæ fracturam *transversalem* perfectè sanatam à D. MOREAU, Chirurgiam ad duo millia exercecente.

— M. BOTENTUIT, cujus nota est in ossium morbis peritia, plures Patellæ fracturas transversales ad curationem absolutam feliciter duxit: ex illis unam in quâ Callum apparet solidissimum servat M. Fargeix.

— In aphor. 346. Comment. occurrit historia quâ Constat « in foemina jam quinto » mense gravidâ patellam sinistri pedis fractam, sex septimanarum spatio curatam fuisse » sic ut in domo obambulare, licet enim quâdam difficultate poruerit. Undè, &c. » &c. Wanswiet, T. I. p. 523.

lis autem annuunt, *transversalis* curam negant, argumenta succidunt enervata, frustra⁽⁵⁾que reluctantur Adversantes (5).

Paucis igitur anatonem partis exponamus.

III.

EX ANATOMIA.

Sub genu compositionem intrant partes communes, ac propria: *Tibia* ^{Genu.} *suprema*, *Femoris* inferior extremitas, & Patella.

Femur, sicut ossa longa, duas in extremitates quas separat *Διαφύσις* ^{Femur.} dividunt. Superior obliquâ cervice sustinet caput semi-sparicum, cujus ope crus in *acetabulo* variis versatur motibus. Quadrata *Femoris* apparet inferior extremitas: facies anterior posteriori excavata minùs, interna verò globosa magis exteriori.

Adfunt condyli duo, *Valle* posteriùs disjuncti; internus longior, la- ^{Condyl.} tior at externus. Anteriùs, desuperque Condylus levi depressione cir- ^{Trochlea.} cum-cincta trochlea surgit. Condylorum *tuberositates* lateraliter promi-
nent.

IV.

Gemino vertice caveis glenoïdibus effosso terminatur *Tibiae* ^{Tibia.} superior extremitas; cum condylis femoris per *γυγγυμον* articulatur. Tuberositatibus gemellis, glenoïdes, internam & in externam distinguuntur ca-

(5) Undique verò memorata leguntur quibus constat, peculiari causâ, ossa quævis coadunari non potuisse.

— Ruifchius narrat quodd « in cadavere hominis sani laqueo suffocati invenerit duo ex
« anterioribus carpi ossibus, ante triennium fracta nondum coaluisse. . . . Obs. anat.
« Chirur. obs. IV. p. 8.

— D. WANSWIETEN (oper. jam Cit.) vidit « mulierem cui humeros fractum fuit, &
» postea restitutum ex Arte, sed nunquam coaluit.

— In Centur. multa ipsius generis exempla refert Hildan. Referunt & alii: Quid ad
nos? aut temperies, aut peculiaris causa, aut curandi modus incusatur.

vitates, quarum una oblonga & concava magis. *Tibiæ* cervix interiùs obrotunda; externè cameratà depressaque. *Peronei* capitis articulo. *Tuberositas tibialis* prodit anteriùs; plana quidem postica pars.

Extremitas inferior, interno latere malleum potrahit internum; at in externo, *Peronei* recessus notatur: denique in cavum definit articulare qui trochleam *Astragali*, multiplices ad pedis motus, recipit.

V.

Patellæ. Trochleæ *Femoris* in aspectu Patella sita jacet. Externa facies convexa rugosaque videtur: interna verò lævigata, est, articulationum ad instar cartilagine recta. In geminam superficiem partitur; quoad circumferentiam, ovatam dicunt. Musculo Recto-gracili insertionem supeditat coronis; infimæ parti, patellæ vinculum stat adhærens. Cum trochleâ *Femoris* articulatur; *Tibiæ* alligatur *tuberositati*.

Patel. motus. Dum flectitur *Tibia*, descendit; dum extenditur, ascendit *Rotula*: en soli-met motus. *Tibiæ* verùm extensione peractâ, adhuc extensores contrahi possunt; tunc ascensionis in *Rotulâ* motus conspicitur alter.

Tibiæ flex. Tibiam flecunt *Biceps*, *Semi-nervosus*, *Semi-membranosus*, *Gracilis-internus*, *Sartorius* atque *Popliteus*.

Extens. Extensores, sunt *Vastii* duo, *Cruralis* & *Recto-gracilis* quorum ut *ὑπομῆχλιον* haberi Patella potest.

Poplitæi, capitisque longi *Bicipitis* ope, in externam semi-rotationem; at in internam, aliorum flectentium subsidio, *Tibia* fertur.

V I.

EX CHIRURGIA.

Defin. gener. **FRACTURA**, Græcis *καταγμα*, est in osse continui solutio à causâ extraneâ & violenti (6).

Speci. Frae. Patellæ. Vel in longum, vel transversè, vel frustillatim rumpi Patella solet. Nisi complicata, impossibilis fractura longitudinalis: ut patella sit icta

(6) P. Ægin. lib. 6. cap. 89. de fract.

securi, vel *glande tormentaria* vel *bombardæ segmento* percussa necessum Causæ.
est. Absque vulnerante causâ transversalis accidit (7); at tamen ex alto
lappus ingentes &c; *transversè* sicut & *frustillatim* fracturam produciunt.

Facile dignoscitur fractura simplex seu *transversa*: imponantur genu Diagno.
digiti, fragminum intervallum subito persentitur. Ascensu discedit pars
superior; infima moratur.

Differt, etiam in *transversâ*, prognosis. Si superius aut inferius mini- Progno.
mum sit fragmen, molesta cura statuatur; si per medium, timent qui-
dem authores ne motus reddat asperos in articulo calli profusa mate-
ries (8). *Longitudinalis*, causarum intensitate, periculosior. *Frustilla-*
tim, & gravis & sinistra dijudicetur.

VII.

Fortè nullus è morbis toties industriam quàm fractura Patellæ susci-
pavit. Non mirum. Anceps à plerisque curatio censetur; at dum instan-
tia mala resistunt, MEDENTI nulla quies. Haud unquam verò assurrexere
media quæ litem absolvere valuerint: varia tamen usu confirmata in-
dicabimus: antea fracturam reducendi modos subjiciemus examini. Haud
pridem notæ FASCIÆ UNIENTIS descriptionem demùm exhibebimus (9).

VIII.

Sunt situs in *modo-faciendi* plures. Tibiâ jam extensâ, adversus ali-
quid fixum, plantâ, pedem insistere cogunt; tunc pollicum ope suc-
cessivâ, ascensam partem ossis in sedem relictam paulatim impellunt (10)

Situs ad re-
positi.
Verticalis.

(7) Hoc asserit D. Petit, in suo de off. morb. Tract. p. 224.

(8) Heist. insti. Chir. Cap. IX. de Parel. fract. § III.

(9) Illa fascia dicta l'UNISSANT, eventu felici casibus in multis applicata fuit; hanc
quidem ad utilitatem publicam, nec-non ad ingeni Theos Præsidis laudem, revelare
nobis est animus.

(10) Verba D. Petit, facile dignoscuntur. p. 228. oper. cit.

— Guy de Chaul, . . . Joubert, . . . &c.

Longitudi.

Alii suram pulvinum suprà ponunt; ita tamen ut, alto pede, corpus & crura levem angulum effingant.

» Aegro supino decumbente (ait Heisterus (11)) pedeque extenso, manibus fragmenta solerter utrinque compellentur, &c.

Angularis.

Tibiâ jam extensâ, ad angulum usque rectum crus inflectere trunco nuperrimè consiliavit M. Valentin, Arte nostrâ peritus (12).

Non situm, non curam peculiarem quàm in fracturâ tibiæ commendant quidam Authores (13).

I X.

Potior situs.

Vera utiliorque positio est illa quâ musculi *Tibiæ*, pede libero, relaxantur... *Longitudinalis* ergò quæ ferè nunc eadem est ac *angularis* [Si strictius sumere verba non expediat] validè congruit: *longitudinalis* enim ad *angularem* referri potest. In *verticali*, pes infixus terrâ tenetur; sustentatur Tibiâ corpus: suppetias enim mutant ac mutantur musculi, & sæpiùs qui distrahuntur remissos falsò crederes.

Hoc in præsentî casu, corpus inertè ponatur (14): nullus è musculis cogatur contractione; præcipuè *Recto-gracilis*, ex illis solus qui *punctis*

(11) Instit. Chir. Loc. Cit. § IV.

(12) Rech. Crit. sur la Chir. Mod. Dissert. p. 173.

(13) Quod *Patellam* spectat ad tibiæ fract. refert Paræus... de fract. Rot. Cap. XXIII, &c.

— Hic notandum incumbit quòd Paræus nec ossis naturam accuset, nec adunationis prædicere impossibilitatem. ... « Pour le pronostic, je dys que jamais je n'ai vu que ceux » qui ont eu cette partie rompue, ne soient demeurés claudicans, parce que la con- » jonction faite par le callus empêche le genouil se pouvoir fléchir. ...

SUPERIUS ALIUNDÈ . . . « Il faut situer la jambe comme si elle étoit rompue, jusqu'à » ce que le Callus soit fait & ENDURCI. . . Hæc sunt verba Magistri.

(14) » Ex quiescente quidem ac remisso rectitudines spectandæ sunt, velut in manûs » figurâ, . . . Hippoc. lib. de Medic. Offic. Tom. XII. pag. 87. 88.

— Quibus in figuris Quàm oriamur, singulas corporis partes habere consuevimus, hæc in curacionibus eligendæ sunt. . . Galen. in suis Comment.

alternâ vice *mobilibus* vigeat : angulum exprimant corpus & crura : denique præsertim viretur aliarum partium distractio. Hæc igitur *longitudinalis suis* commoda.

X.

De Topicis (15), de medicaminibus internis (16), sponte nostrâ nulla dicemus.

X I.

Ut reducta *Patellæ* fractura contineatur, varia obviâ procedunt Media conti. media.

Eamdem ac *Tibiæ* fracturæ fasciam Quidam proposuerunt (17).

Heisterus (18) fracturæ longitudinali *fasciam-unientem ad vincienda ventris ac frontis longiora vulnera propositam*, (*) adaptat. In transversali *emplastra vel lunata* (**), *vel perforata* (***) commendat.

D. Petitus & alii ad usum fasciæ, circonvolutionum ergo dictæ 8, invitant. Volutata lunataque duo addunt lintea : diversos inter tæniæ circuitus inducunt fasciolam, Capita cujus ad constringendum apparatus & partes approximandas inserviunt ; denique advocant *Palearia* (19).

In Nosocomio Parisiensi [Hôtel-Dieu] eadem celebratur fascia :

(15) Sⁱ. Dominici Fani præfectus Oviedo plantæ Monstrum-Arboris dictæ descriptionem exhibet. . . . applicatione solâ vel corticis, foliorumvè tritorum quælibet ossis fractura sanatur. . . . Dum effectum producit, cuti tenax adhæret ; curatione peractâ, ultrò labitur emplastrum.

Territorium Sⁱ. Dominici Fanum inter & Yaguana huic Arbusculæ placet. Hist. gêner. des Voyages, Part. III. Liv. V. Tom. XII.

(1) Quodd non lapidis *σπερχολλης* ab Hildano tam laudati, jam jam renovatus fuerit usus nonne mirandum ?

(17) Paræus Cap. XXIII. de Rot. du geno.

(18) Instit. Chirurg. loc. cit. . . . (*) de vulner. univers. spectat. § XXXIX. lib. I. cap. I. Vid. Tabul. II. litt. f. . . . (**) Vid. Tabul. IX. fig. 2. (***) Vid. Tabul. IX. fig. 3.

(19) Oper. jam cit. pag 229 & seq.

curvatorum loco, unum è corio circulum admittunt. Circuli vacuum implent *Patellæ* reductæ partes (20).

Jam jam verò diximus M. Valentin in repositione firum angularem confiliaſſe; ad curationem, illum ſoleâ ſecundatum, ſervatumque pulvinaribus oſtentat (21).

XII.

Partes fractas continere faſciâ Authores unâ conſentiunt (22). . . .
 » retentio in ſitu ſit faſciis, ſpleniis, ferulis, canalibus, quietem conciliando, tum impediendo & dirigendo actionem muſculorum (23).

Facili ratiocinio probaretur abſoluta diuturnaſque (24) faſciam fractas partes approximantem applicandi neceſſitas. Arduam enim coadunationem pendere à difficultate, in immediato contactu, adverſâ fronte, perfectâ continuâſque admotione continendi rotulæ fragmina, Prac-

(20) « La rouelle du genouil rarement eſt rompue, mais le plus ſouvent elle ſe diſtort.
 » Il faut en ſon rabillement aſſembler des doigts ſes fragmens, & les eſgalifer ſuivant
 » ſa figure, emplâtrer & mettre une ronde aſtelle faite de ſemelle, puis lier ainſi qu'il
 » appartient. . . . Joub. trad. de Guy de C. Traçt. V. doçt. I. chap. VIII. de la fracture
 du genouil, pag. 397.

(21) Recher. Criti. Diſſert. pag. 173.

(22) Hippoc. Galen. Fabr. ab aquap. Solingius. Purman. Heiſt. Petit. Paſſi. Garengéot. Multique è recentioribus.

(23) Boerh. aphor. 354. . . . D. Wanſwiet. Comment.

— D. Wanſwiet. in ſeq. aphor. Comment. pag. 534. . . . « requiritur ut ſic firmetur
 » membrum læſum, ut immobile omninò ſit, hoc autem ſit faſciis, ſpleniis &c.

— Heiſt. de Patel. fract. . . . « pes afflictus itâ & collocetur & deligatur ut nec inſecti
 » facile, nec diſturbari valeat.

(24) » Vix enim glutinari ſatis ante illud tempus [9 aut 10 hebdomades] patellæ
 » fragmenta conſueverunt, & qui tam diu non quieſcunt, plerumque claudicare ſolent.
 Heiſt. Inſt. Chirurg. loc. cit. . . . Ruſch. obſ. JII.

— Rotulæ fractæ ſex ſeptimanarum ſpatio curatæ exemplum refert D. Wanſwieten, Comment. aphor. 346. Tom. I. pag. 523.

— In ſimplici caſu 10, 11, 12 hebdomadas curæ impendimus. Relativum ad acciden-
 tia tempus aliundè producat.

tici notæ melioris autumant (25). Objectum illud apprimà desideratum circa versarunt; hæc perficà tenùs vix tetigere manu. Conopea sanè dis-
 cutionis Experientiæ sagaci, Fasciæque nostræ (26) usui jam prospero
 distrahere liceat : Equidem concludamus ;

ERGÒ PATELLÆ TRANSVERSIM
 FRACTURA SANABILIS.

(25) Ne noxiam ancipitemque membri rigiditatem producat admotio & perfecta & continua non timemus. Si, quod sæpius, eveniat illa; tempore, motibus leniter iteratis, dulcibus, à ratione ductis, fomentationibus, siccis frictionibus, aliisque mediis tollitur.

Hic notandum 1°. majusvè, minusvè temporis spatium pro diversâ Subjectorum in-
 dole, pro fracturarum specie diversâ, &c. necessarium esse. 2°. non totam suprâ par-
 tem fieri debere fomentationes, balnea, &c. ex illorum usu repetito dissolveretur call;
 materies, à se recederent fragmenta, & vana ac inutilis cura fuisset.

Quidam aliundè, ut ex multis probatur allatis, ista accidentia memorant ad asse-
 rendum quòd si Patellæ aliquoties fractura solideretur, instantanea sit sanatio.

(26) UNIENTIS-FASCIAE DESCRIPTIO.

Patellæ Uniens-Fascia ex partibus octo confatur; in descriptione ordinem applicatio-
 nis sequemur.

1°. *Canale ferreum* adest proprio pulvinare munitum, itaque dispositum ut illa pars,
 Anatomicis Genu, firmata sustineatur.

2°. *Pulvinar complementi*, ut pars molliter sedeat necessarium.

3°. Duo sunt è corio Amentra semi-circularia, quâlibet in extremitate fibulis armata;
 Superius illud, aliud inferius submittitur.

4°. *Epi-poples & Up'poples*, fibulâ in medio solidiori sitâ, quisque paratus. Ad *Amen-
 terum semi-circularium* fibulas tendere debet è quatuor quævis extremitas coriacea.

5°. Tandem adest è serico vel stamine & Amentum-copulans inferius, & Amentum-
 copulans superius; diverso modo texuntur extremitates: quæ solidiori Epi & Up'poplitis
 medio respondent & hærescunt, Tæniarum ad instar effinguntur. Tæniæ superioris &
 inferioris *Amenti* se se decussant; Extremitates aliæ, integræ, liberoque passu, fibulâ
 Epi-poplitis, Up'poplitisque fibulâ inducuntur; &, ad fracturæ partes approximandas,
 contactuque necessario retinendas, illis stringuntur.

Typis ANDRÆ-CAROLI CAILLEAU, viâ Sancti-Severini,
 è regione Ecclesiæ. 1775.

